

Zoetis pristato du naujus produktus!

NAUJIENA



Lenivia®
izenivetmabas



Lenivia padės šunims...

3 MĖNESIUS

MAŽINTI OA
SUKELTĄ SKAUSMĄ

3



Viena Lenivia injekcija veiksmingai mažina osteoartrito (OA) skausmą šunims 3 mėnesius¹



Naujas monokloninis anti-NAF antikūnas (mAk)¹



Portela®
relfovetmabas



Portela padės katėms...

3 MĖNESIUS

MAŽINTI OA
SUKELTĄ SKAUSMĄ



Viena Portela injekcija veiksmingai mažina osteoartrito skausmą katėms 3 mėnesius²



Naujas monokloninis anti-NAF antikūnas (mAk)²



Patvirtinta katėms, turinčioms LIN (1-3 stadija pagal IRIS)

NORITE SUŽINOTI DAUGIAU?

Nedvejodami susisiekite su mumis! Telefonu: +370 621 60 128 arba el. paštu: paulius.zenavicius@zoetis.com



Lenivia®
izenivetmabas



Portela®
relfovetmabas

Solensia®
frunevetmabas

Librela®
bedinvetmabas

MUMS SVARBI
JŪSŲ NUOMONĖ

Jeigu jau esate naudoję monokloninius antikūnus, skirtus OA skausmo kontrolei – būtume dėkingi už jūsų atsiliepimą apie tai, kaip jie veikė jūsų praktikoje.

Mes įsiklausome:

Pasidalinkite savo patirtimi, naudojant monokloninius antikūnus



Mums svarbi jūsų nuomonė ir rezultatai, kuriuos pastebėjote naudodami monokloninius antikūnus savo pacientams.

Būtume dėkingi, jei pasidalintumėte savo nuomone, užpildydami mūsų apklausą, ir padėtumėte mums geriau suprasti, kokie Jūsų ir Jūsų pacientų lūkesčiai sietini su naujausių produktų – Lenivia ir Portela – veiksmingumu ir kokią patirtį turite su seniau klinikinėje praktikoje naudojamais Librela ir Solensia.

Pasidalinkite Savo Patirtimi

Mes džiaugiamės galėdami ir toliau Jums padėti, integruojant naujausius veterinarinius vaistus į jūsų OA skausmo gydymo protokolus. Jei jums reikia papildomos informacijos arba turite klausimų, **Zoetis** atstovas visada pasiruošęs padėti.



Lenivia®
izenivetmabas



Lenivia, 0,5 mg, 1,0 mg, 1,5 mg, 2,0 mg, 3,0 mg injekcinis tirpalas šunims. **Veiklosios medžiagos:** Kiekviename 1 ml flakone yra: izenivetmabo*: 0,5 mg, 1,0 mg, 1,5 mg, 2,0 mg, 3,0 mg.*Izenivetmabas – tai šunims skirtas monokloninis antikūnas, veikiantis šunų nervų augimo faktorių (NAF), gautas rekombinacijos metodu naudojant kininio žiurkėno kiaušidžių (CHO) ląsteles. Skaidrus arba šiek tiek opalescuojantis tirpalas be jokių matomų dalelių. **Naudojimo indikacijos:** Šunims skausmo, susijusio su osteoartritu (OA), sumažinimui. **Kontraindikacijos:** Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų. Negalima naudoti šunims iki 12 mėn. Negalima naudoti gyvūnams, planuojamiems vesti. Negalima naudoti gyvūnams vaikingumo ar laktacijos metu. **Specialieji įspėjimai:** Šis veterinarinis vaistas gali sukelti antikūnų prieš vaistą susidarymą. Tokių antikūnų indukcija 9 mėnesių trukmės pakartotinių dozių klinikinio saugumo ir veiksmingumo tyrimo metu buvo pastebėta 3,46% (10/289) šunų. Antikūnai prieš vaistus buvo susiję su mažesne izenivetmabo koncentracija serume ir veiksmingumo praradimu. Nebuvo jokių nepageidaujamų reiškinų (NR), susijusių su antikūnų prieš vaistus buvimu (imunogeniškumas). Imunogeniškumas nebuvo tirtas šunims, anksčiau gydytiems kitais monokloniniais antikūnais prieš NAF. Klinikinio tyrimo metu pastebėtas poveikio silpnėjimas kiekvieno gydymo intervalo pabaigoje. Kliniškai pakankamas skausmo sumažėjimas gali būti pasiektas ne visiems šunims, ypač šunims, sergantiems sunkia OA forma. Jei po pradinės dozės nepastebima jokio poveikio arba jis ribotas, arba jei poveikis neišlieka per visą 3 mėnesių dozavimo intervalą, rekomenduojama pereiti prie alternatyvaus gydymo. **Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės:** naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims: Jei dėl klinikinės būklės šuo negalėjo tinkamai mankštintis iki gydymo, rekomenduojama šuniui palaipsniui (per kelias savaites) didinti mankštos krūvį (saugant, kad šie šunys nepersitemptų). Klinikinių tyrimų metu šunims rentgenogramos buvo daromos tik atrankos metu. Todėl galimi neigiami poveikiai osteoartrito progresavimui tirti nebuvo; **asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams:** Atsiktikiniai įsišvirkštus, gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos, įskaitant anafilaksiją. Įsišvirkštus atsiktikintai pakartotinai, gali padidėti padidėjusio jautrumo reakcijų pasireiškimo rizika. Nedidelei žmonių grupei, vartojusiai terapines žmogaus monokloninių antikūnų dozes prieš NAF, pasireiškė nedideli ir grįžtami periferiniai neurologiniai požymiai (pvz., parestezija, distestezija, hipestezija). Šių reiškinų dažnis priklauso nuo tokių veiksmų kaip dozės dydis ir vartojimo trukmė. Šie reiškiniai buvo laikini ir išnyko nutraukus gydymą. Nervų augimo faktoriaus (NAF) svarba užtikrinant normalų vaisiaus nervų sistemos vystymąsi yra gerai nustatyta ir laboratoriniais tyrimais su nežmogišiais primatais, naudojant žmonių antikūnus prieš NAF, nustatytas reprodukcinius ir vystymosi toksinius poveikius. Neščios moterys, moterys, planuojančios pastoti, ir moterys, maitinančios krūtimi, turi naudoti ypatingai apdairiai, kad atsiktikintai neįsišvirkštų. Jei atsiktikintai įsišvirkštus pasireiškia nepageidaujami reiškiniai, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto pakuotės lapelį ar etiketę. **Nepageidaujami reiškiniai:** Šunys:

Dažna (1–10 gyvūnų iš 100 gydytų gyvūnų)	Staigus skausmas po injekcijos
Nedažna (1–10 gyvūnų iš 1 000 gydytų gyvūnų)	Ataksija, polidipsija, poliurija
Reta (1–10 gyvūnų iš 10 000 gydytų gyvūnų)	Letargija, anoreksija
Labai reta (<1 gyvūnas iš 10 000 gydytų gyvūnų, įskaitant atskirus pranešimus)	Padidėjusio jautrumo reakcija (snukio tynis) ¹ , imuninės sistemos sukelta hemolitinė anemija, imuninės sistemos sukelta trombocitopenija

*Pasireiškus tokioms reakcijoms, reikia skirti tinkamą simptominių gydymą.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamus reiškinius. Tai leidžia nuolat stebėti veterinarinio vaisto saugumą. Pranešimus, pageidautina, turėtų siųsti veterinarijos gydytojas registruotoji arba nacionalinei kompetentingai institucijai per nacionalinę pranešimų teikimo sistemą. Taip pat žr. atitinkamus kontaktinius duomenis pakuotės lapelyje. **Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos:** Nėra saugumo duomenų apie ilgalaikį NVNU ir izenivetmabo naudojimą vienu metu šunims. Klinikinių tyrimų su žmonėmis metu buvo pranešta apie greitai progresuojantį osteoartrito pacientams, gydomiems humanizuotais monokloniniais antikūnais prieš NAF. Šių reiškinų dažnis padidėjo esant didelėms dozėms ir tiems žmonėms, kurie ilgą laiką (ilgiau nei 90 dienų) vartojo nesteroidinius vaistus nuo uždegimo (NVNU) kartu su monokloniniu antikūnu prieš NAF. Kitų laboratorinių tyrimų dėl šio veterinarinio vaisto saugumo naudojant kartu su kitais veterinariniais vaistais atlikta nebuvo. Klinikinių tyrimų (kurie) šie veterinariniai vaistas buvo naudojamas kartu su veterinariniais vaistais, kaip sisteminiai antibakteriniai vaistai ir antiparazitikai, sąveikų nepastebėta. Jeigu vakciną (-as) reikia naudoti tuo pat metu kaip ir šį veterinarinį vaistą, vakciną (-as) ir šį veterinarinį vaistą reikia švirkšti į skirtingas vietas. **Dozės ir naudojimo būdas:** Švirkšti po oda. Rekomenduojama dozė yra 0,5–1,25 mg/kg kūno svorio, vieną kartą per tris mėnesius. **Pakuotė ir laikymo sąlygos:** Kartoninė dėžutė su 2 flakonais po 1 ml. Laikyti ir gabenoti šaltai (2–8 °C). Negalima sušaldyti. Laikyti originalioje pakuotėje. Saugoti nuo šviesos. **Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės:** naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims: Šio vaisto saugumas ir veiksmingumas nebuvo tirtas katėms, sergančioms > 3 stadijos inkstų liga pagal IRIS. Vaisto naudojimas tokiais atvejais turi būti pagrįstas atskirą veterinarinio gydytojo naudos ir rizikos įvertinimu. Klinikinių tyrimų metu šnarių rentgenogramos buvo daromos tik atrankos metu. Todėl galimi neigiami poveikiai osteoartrito progresavimui nebuvo tirti; **asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams:** Atsiktikiniai įsišvirkštus, gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos, įskaitant anafilaksiją. Įsišvirkštus pakartotinai, gali padidėti padidėjusio jautrumo reakcijų pasireiškimo rizika. Nedidelei daliai žmonių, vartojusių terapines žmogaus monokloninių antikūnų prieš NAF dozes, buvo pranešta apie nedidelius ir grįžtamus periferinius neurologinius požymius (pvz., parestezija, distestezija, hipestezija). Šių reiškinų dažnis priklauso nuo tokių veiksmų kaip dozės dydis ir vartojimo trukmė. Šie reiškiniai buvo laikini ir išnyko nutraukus gydymą. Nervų augimo faktoriaus (NAF) svarba užtikrinant normalų vaisiaus nervų sistemos vystymąsi yra gerai nustatyta ir laboratoriniais tyrimais su nežmogišiais primatais, naudojant žmonių antikūnus prieš NAF, nustatytas reprodukcinius ir vystymosi toksinius poveikius. Neščios moterys, moterys, planuojančios pastoti, ir moterys, maitinančios krūtimi, turi naudoti ypatingai apdairiai, kad atsiktikintai neįsišvirkštų. Jei atsiktikintai įsišvirkštus pasireiškia nepageidaujami reiškiniai, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto pakuotės lapelį ar etiketę. **Nepageidaujami reiškiniai:** Katės:

Labai dažna (> 1 iš 10 gydytų gyvūnų)	Staigus skausmas sušvirkštus
Dažna (1–10 gyvūnų iš 100 gydytų gyvūnų)	Dermatitas
Nedažna (1–10 gyvūnų iš 1 000 gydytų gyvūnų)	Niežulys Odos šašai Injekcijos vietos tynis Injekcijos vietos plaukų slinkimas

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamus reiškinius. Tai leidžia nuolat stebėti veterinarinio vaisto saugumą. Pranešimus, pageidautina, turėtų siųsti veterinarijos gydytojas registruotoji arba nacionalinei kompetentingai institucijai per nacionalinę pranešimų teikimo sistemą. Taip pat žr. atitinkamus kontaktinius duomenis pakuotės lapelyje. **Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos:** Nėra saugumo duomenų apie nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) ir relfovetmabo naudojimą vienu metu katėms. Klinikinių tyrimų su žmonėmis metu buvo pranešta apie greitai progresuojantį osteoartrito pacientams, gydomiems humanizuotais monokloniniais antikūnais prieš NAF. Šių reiškinų dažnis padidėjo esant didelėms dozėms ir tiems žmonėms, kurie ilgą laiką (ilgiau nei 90 dienų) vartojo nesteroidinius vaistus nuo uždegimo (NVNU) kartu su monokloniniu antikūnu prieš NAF. Kitų laboratorinių tyrimų dėl šio veterinarinio vaisto saugumo naudojant kartu su kitais veterinariniais vaistais atlikta nebuvo. Jeigu vakciną (-as) reikia naudoti tuo pat metu kaip ir šį veterinarinį vaistą, vakciną (-as) ir šį veterinarinį vaistą reikia švirkšti į skirtingas vietas. **Dozės ir naudojimo būdas:** Švirkšti po oda. Rekomenduojama dozė yra 0,5–1,25 mg/kg kūno svorio, vieną kartą per tris mėnesius. **Pakuotė ir laikymo sąlygos:** Kartoninė dėžutė su 2 flakonais po 1 ml. Laikyti ir gabenoti šaltai (2–8 °C). Negalima sušaldyti. Laikyti originalioje pakuotėje. Saugoti nuo šviesos. **Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės:** naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims: Šio vaisto saugumas ir veiksmingumas nebuvo tirtas katėms, sergančioms > 3 stadijos inkstų liga pagal IRIS. Vaisto naudojimas tokiais atvejais turi būti pagrįstas atskirą veterinarinio gydytojo naudos ir rizikos įvertinimu. Klinikinių tyrimų metu šnarių rentgenogramos buvo daromos tik atrankos metu. Todėl galimi neigiami poveikiai osteoartrito progresavimui nebuvo tirti; **asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams:** Atsiktikiniai įsišvirkštus, gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos, įskaitant anafilaksiją. Įsišvirkštus pakartotinai, gali padidėti padidėjusio jautrumo reakcijų pasireiškimo rizika. Nedidelei daliai žmonių, vartojusių terapines žmogaus monokloninių antikūnų prieš NAF dozes, buvo pranešta apie nedidelius ir grįžtamus periferinius neurologinius požymius (pvz., parestezija, distestezija, hipestezija). Šių reiškinų dažnis priklauso nuo tokių veiksmų kaip dozės dydis ir vartojimo trukmė. Šie reiškiniai buvo laikini ir išnyko nutraukus gydymą. Nervų augimo faktoriaus (NAF) svarba užtikrinant normalų vaisiaus nervų sistemos vystymąsi yra gerai nustatyta ir laboratoriniais tyrimais su nežmogišiais primatais, naudojant žmonių antikūnus prieš NAF, nustatytas reprodukcinius ir vystymosi toksinius poveikius. Neščios moterys, moterys, planuojančios pastoti, ir moterys, maitinančios krūtimi, turi naudoti ypatingai apdairiai, kad atsiktikintai neįsišvirkštų. Jei atsiktikintai įsišvirkštus pasireiškia nepageidaujami reiškiniai, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto pakuotės lapelį ar etiketę. **Nepageidaujami reiškiniai:** Katės:

Šaltiniai: 1. Lenivia EU SPC. 2. Portela EU SPC. Patvirtinimo data: 2026 m. liepos mėn. MM-50643